

Indice d'abondance de juvéniles de saumon en 2014
Bassin du Pont du Roc'h
(Morbihan)


* Surface du BV : 65 km²
 * Surface de production : **42 927m²**
 d'équivalent radier/rapide **1,22%** de la surface de production régionale

* 3 stations échantillonnées
 * IA sur le bassin depuis 2001


* IA moyen pondéré de 2004 à 2014 : **14.7**

* ce cours d'eau n'est pas classé saumon

* contribution du bassin à la production bretonne en juvéniles en 2014 : **0.46%**



IA sur le Pont du Roc'h de 2001 à 2014



commentaires:


L'indice d'abondance moyen 2014 est inférieur à celui de 2013, mais au-dessus de 2012 qui était la 2ème moins bonne année. Il reste dans la gamme basse des observations précédentes.

L'indice d'abondance du Pont du Roc'h reste néanmoins très nettement inférieur à la moyenne régionale, ainsi qu'aux niveaux observés entre 2003 et 2006.

commentaires:

Les tronçons aval et médian présentent presque la même production de juvéniles : la production du tronçon aval est supérieure à la moyenne inter-annuelle, alors que celle du tronçon médian est nettement inférieure. Le tronçon amont n'a pas été productif cette année.

Contribution de chaque station à la production de juvéniles du Pont du Roc'h



Sur le Pont du Roc'h, les résultats d'indices d'abondance sont très fluctuants, surtout depuis 2008, les résultats observés auparavant étaient plus stables et plus élevés. L'année 2014 se situe à un niveau inférieur à la moyenne interannuelle. Les deux tronçons les plus productifs sont la partie basse et la partie médiane du cours d'eau, contrairement aux années précédentes où la partie médiane était plus productive.