


Indice d'abondance de juvéniles de saumon en 2012 Bassin du Kergroix (Morbihan)


* Surface du BV : 90 km²
* Surface de production : **25 760m²**
d'équivalent radier/rapide soit **0,78%** de la surface de production régionale

* 3 stations échantillonnées
* IA sur le bassin depuis 2001
* IA moyen pondéré de 2001 à 2012 : **28.6**
* IA compatible avec une exploitation TAC : **16**

* contribution du bassin à la production moyenne bretonne en juvéniles en 2012 : **0,38%**



IA moyen du bassin du Kergroix de 2001 à 2012




commentaires:

Les indices d'abondance 2012 sont faibles, l'année 2012 est même la plus faible depuis 2001. Les indices observés sur la période 2007-2012 sont à un niveau très inférieur à celui des années 2003-2006. L'indice d'abondance moyen du Kergroix est largement en dessous de la moyenne régionale 2001-2012.

commentaires:

Tous les tronçons, et particulièrement le tronçon médian, se trouvent à un niveau de production 2012 inférieur à ceux des années précédentes. Le tronçon amont est celui qui a produit le plus en 2012.

Contribution de chaque station à la production du Kergroix



Les indices d'abondance du Kergroix en 2012 sont les plus faibles depuis 2001. Les tronçons aval et médian ont été particulièrement peu productifs. Cependant, ces résultats sont probablement sous-estimés du fait des mauvaises conditions de pêche (niveaux d'eau élevés) surtout sur l'aval du bassin.